

Инструкция

по применению ветеринарного препарата Бинакар Форте

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Бинакар Форте (Binakar Forte).

Международное непатентованное название: имидаклоприд, фипронил.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Лекарственный препарат Бинакар Форте в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: имидаклоприд — 80 мг, фипронил — 15 мг, а в качестве вспомогательных веществ: бензиловый спирт, агидол-1, лимонную кислоту.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от светло — желтого до желто — коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя — 3 года с даты производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат Бинакар Форте выпускают расфасованным по 0,4 мл, 0,5 мл, 1 мл и 2 мл в полимерные тубик-пипетки соответствующей вместимости, упакованные по 2 и 4 штуки в индивидуальные картонные пачки.

Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению и наклейками для ветеринарного паспорта.

5. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Лекарственный препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Лекарственный препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Бинакар Форте относится к фармакотерапевтической группе: инсектоакарицидные средства.

10. Действующие вещества, входящие в состав лекарственного препарата, обладают контактным противопаразитарным действием на половозрелые и личиночные фазы развития блох (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), вшей (*Linognathus setosus*), власоедов (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), иксодовых клещей (*Ixodidae*), паразитирующих у собак и кошек. Лекарственный препарат защищает животных от нападения комаров (*Aedes aegypti*, *Culex pipiens*), мух (*Stomoxys calcitrans*) и москитов (*Phlebotomus rapatasi*, *Phlebotomus perniciosus*).

Регулярное применение лекарственного препарата Бинакар Форте снижает риск возможной передачи животным трансмиссивных заболеваний, таких как: боррелиоз, риккетсиоз лейшманиоз, а также возбудителя собачьего эрлихиоза и др.

Имидаклоприд — неоникотиноид, механизм действия которого заключается в блокировании работы белковых рецепторов нервных клеток паразита, что ведет к невозможности проведения нервного импульса и далее — к параличу и смерти.

Фипронил — инсектоакарицид группы фенилпиразолов, механизм его действия заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов эктопаразитов, нарушении передачи нервного импульса, что приводит к параличу и гибели насекомых и клещей.

При совместном применении имидаклоприд усиливает инсектоакарицидное действие фипронила.

При нанесении лекарственного препарата на кожу имидаклоприд и фипронил практически не всасываются в системный кровоток, накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах и оказывают длительное контактное инсектоакарицидное действие.

Однократная обработка животного лекарственным препаратом Бинакар Форте обеспечивает уничтожение блох и клещей в течение 24 часов.

Гибель насекомых наступает в течение 12-24 часов после обработки животного.

Защитное действие лекарственного препарата против клещей продолжается до 4 недель, против насекомых — 4-5 недель.

Бинакар Форте по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), при нанесении на кожу в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА

11. Бинакар Форте применяют собакам и кошкам для лечения и профилактики акарозов, вызываемых иксодовыми клещами, энтомозов, вызываемых блохами, вшами и власоедами; аллергического дерматита, связанного с укусами насекомых и клещей, а также с целью предотвращения нападения эктопаразитов на животных.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к его компонентам (в том числе в анамнезе).

Запрещается применение лекарственного препарата больным инфекционными заболеваниями, ослабленным и выздоравливающим животным.

13. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу.

Обработку животных следует проводить в резиновых перчатках.

По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

В течение 24 часов после обработки животных не следует гладить и подпускать к маленьким детям.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, ее помещают в целлофановый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с ним.

При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки глаз, их необходимо промыть большим количеством воды.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

14. Не следует применять Бинакар Форте щенкам моложе 8-недельного возраста и/или массой менее 1 кг, котятм моложе 8-недельного возраста и/или массой менее 0,5 кг, а также животным других видов.

Запрещается применять лекарственный препарат беременным и лактирующим самкам.

15. Бинакар Форте применяют однократно путем нанесения на сухую неповрежденную кожу животного в места, недоступные для слизывания.

Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Перед применением отрезают кончик тубик-пипетки, раздвигают шерсть и капельно наносят лекарственный препарат в области шеи у основания черепа или между лопатками, в 3-4 точках.

Дозы применения лекарственного препарата зависят от вида и массы животного.

Масса животного	Количество тубик-пипеток
Для собак и щенков мелких пород (тубик-пипетки по 0,5 мл)	
2 — 5 кг	1
5 — 10 кг	2
10-20* кг	4

*При обработке собак массой более 20 кг препарат применяют из расчета 1 мл на каждые последующие 10 кг массы животного.

Для собак и щенков средних пород (тубик-пипетки по 1 мл)	
2-5 кг	1/2
5-10 кг	1
10-20 кг	2
20-30 кг	3
30-40* кг	4

*При обработке собак массой более 40 кг препарат применяют из расчета 1 мл на каждые последующие 10 кг массы животного.

Для собак и щенков крупных пород (тубик-пипетки по 2 мл)	
10-20 кг	1
20-30 кг	1+1/2

30-40* кг | 2

*При обработке собак массой более 40 кг препарат применяют из расчета 1 мл на каждые последующие 10 кг массы животного.

Для кошек и котят (тюбик-пипетки по 0,4 мл)

1-2 кг | 1/2

3-4 кг | 1

4-8 кг | 2

Минимальная терапевтическая доза — 0,1 мл на 1 кг массы животного.

Во время обработки необходимо избегать попадания лекарственного препарата на слизистые оболочки животного.

Не следует мыть или купать животное в течение 24 часов после обработки.

Для уничтожения иксодовых клещей, блох, вшей и власоедов обработку животного проводят однократно, для предотвращения повторной инвазии или для защиты от нападения насекомых — 1 раз в месяц на протяжении всего сезона активности паразитов.

При лечении и профилактике аллергического дерматита, связанного с укусами насекомых и клещей, лекарственный препарат целесообразно использовать в сочетании со средствами патогенетической и симптоматической терапии.

Лекарственный препарат сохраняет свою эффективность после намочения шерсти, однако не следует допускать длительного нахождения животного в воде после обработки.

Если этого избежать невозможно, проводят дополнительную обработку животного препаратом Бинакар Форте под контролем ветеринарного врача.

Дополнительные обработки лекарственным препаратом допускается проводить не чаще 1 раза в неделю.

Если возникает необходимость помыть животное с шампунем, рекомендуется сделать это до обработки препаратом Бинакар Форте.

Для предотвращения повторной инвазии подстилки животных заменяют или обрабатывают инсектоакарицидными препаратами в соответствии с инструкциями по их применению.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций (покраснение, зуд) лекарственный препарат следует смыть водой с моющим средством, промыть кожу и шерсть большим количеством проточной воды и при необходимости назначить животному антигистаминные и симптоматические препараты.

17. При передозировке лекарственного препарата у животных может наблюдаться угнетенное состояние, повышенное слюноотделение, тремор, рвота.

В этом случае лекарственный препарат рекомендуется смыть водой с моющим средством и принять общие меры, направленные на его выведение из организма.

18. Лекарственный препарат Бинакар Форте не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными лекарственными препаратами.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности.

В случае пропуска очередной обработки ее следует провести как можно быстрее в той же дозе и по той же схеме.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

АО «Агробιοпром», 143985, Московская область, Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.