Состав и форма выпуска

ФОРТИКАРБ[®] 5% инъекционный раствор содержит в 1 мл в качестве действующего вещества 50 мг имидокарба.

ФОРТИКАРБ[®] 5% производят в форме стерильного прозрачного раствора светло-желтого цвета в стеклянных или пластиковых флаконах по 10 мл.

Фармакологические свойства

Препарат активен в отношении бабезий Babesia canis и Babesia gibsonii, а также Ehrlichia canis, паразитирующих у собак.

При парентеральном введении имидокарб быстро всасывается из места инъекции и проникает в большинство органов и тканей организма. Препарат практически не подвергается метаболизму в организме животного.

Показания к применению

- собакам для лечения острого, хронического и субклинического (при обнаружении бабезий в крови) <u>бабезиоза</u>, а также его профилактики.

Режим дозирования

Препарат вводят однократно подкожно или внутримышечно в дозе 0,4-0,6 мл 5% раствора на 10 кг массы (2-3 мг/кг массы тела по действующему веществу).

Защитный эффект наблюдается в течение 15-30 дней в зависимости от породы и физиологического состояния животного.

Противопоказания

ФОРТИКАРБ $^{ ext{@}}$ запрещается применять одновременно с хлорорганическими и фосфорорганическими препаратами, а также с ингибиторами холинэстеразы.

При массовой гибели кровепаразитов и разрушении эритроцитов у животных возможно развитие интоксикации. В этом случае необходимо проведение интенсивной терапии, включающей внутривенные инфузии растворов электролитов и симптоматическое лечение.

Особые указания

Препарат относится к умеренно опасным соединениям. В терапевтических дозах не обладает кумулятивным, эмбриотоксическим и мутагенным действием.

Условия и сроки хранения

Препарат хранят с предосторожностью (список Б), в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 до 25 °C.

Срок годности при указанных условиях хранения – 2 года со дня изготовления.