

# БАРС ОШЕЙНИК ОТ БЛОХ И КЛЕЩЕЙ ДЛЯ КОШЕК

## Состав и фармакологические свойства.

Входящие в состав ошейника фипронил и дифлубензурон – регулятор роста насекомых обладают выраженной активностью в отношении личиночных и половозрелых фаз развития блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках. Постепенно выделяясь с поверхности ошейника, активные компоненты переносятся на кожно-волосистой покров животного. Фипронил, не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосистых луковицах и сальных железах кожи животного, и выделяясь на поверхность кожи вместе с секретом желез оказывает длительное контактное и кишечное инсектоакарицидное действие. Регулятор роста насекомых подавляет рост покровных тканей у паразитов, нарушая процесс развития личинки в яйце, линьки личинок, препятствует развитию полноценных куколок и вызывает гибель насекомых и клещей на преимагинальных фазах развития.

## Показания к применению.

Собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при энтомозах (блохи, вши, власоеды) и поражении иксодовыми клещами.

## Противопоказания.

Не рекомендуется беременным в последнюю треть беременности и кормящим самкам, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, а также щенкам и котятам моложе 2-х месячного возраста.

## Порядок применения.

После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и надевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем пропускают свободный конец ленты через фиксатор и излишек ошейника срезают.

Непрерывное использование инсектоакарицидного ошейника «Барс» обеспечивает защиту собак и кошек от блох, вшей, власоедов, иксодовых клещей до 4-х месяцев. В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей на животное, но через 1 день паразиты погибают и засыхают или самопроизвольно отпадают.

## Побочные явления.

В редких случаях, при повышенной индивидуальной чувствительности животного к фипронилу, возможны индивидуальные реакции (избыточное слюноотделение, слезотечение, мышечная дрожь, рвота, раздражение кожи). В этих случаях использование ошейника прекращают.

## **Хранение.**

В закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 до 25 С. Хранить в местах, недоступных для детей.

## **Форма выпуска.**

Полимерная лента длиной 35 см для мелких собак и такого же размера для кошек.