



# БИНАКАР ФОРТЕ

## Инструкция

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Бинакар Форте.  
(Организация-разработчик: АО «АгроБиоПром»,  
105064, Россия, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр. 1, Э 3, пом. XIII)

### Общие сведения

**Регистрационный номер:** 77-3-22.21-4808N#ПВР-3-22.21/03679

**Международное непатентованное название:** имидаклоприд, фипронил.

### Состав и форма выпуска

Лекарственный препарат Бинакар Форте в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: имидаклоприд – 80 мг, фипронил – 15 мг, а в качестве вспомогательных веществ: бензиловый спирт, агидол-1, лимонную кислоту. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от светло-желтого до желто-коричневого цвета. Лекарственный препарат Бинакар Форте выпускают расфасованным по 0,4 мл, 0,5 мл, 1 мл и 2 мл в полимерные тюбик-пипетки соответствующей вместимости, упакованные по 2 и 4 штуки в индивидуальные картонные пачки. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению и наклейками для ветеринарного паспорта.

### Лекарственная форма

Раствор для наружного применения

### Фармакотерапевтическая группа

Фармакотерапевтическая группа: инсектоакарицидные средства.

### Фармакологические свойства

#### Фармакодинамика и фармакокинетика

Действующие вещества, входящие в состав лекарственного препарата, обладают контактным противопаразитарным действием на половозрелые и личиночные фазы развития блох (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), вшей (*Linognathus setosus*), власоедов (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), иксодовых клещей (*Ixodidae*), паразитирующих у собак и кошек. Лекарственный препарат защищает животных от нападения комаров (*Aedes aegypti*, *Culex pipiens*), мух (*Stomoxys calcitrans*) и москитов (*Phlebotomus paratasi*, *Phlebotomus perniciosus*). Регулярное применение лекарственного препарата Бинакар Форте снижает риск возможной передачи животным трансмиссивных заболеваний, таких как: боррелиоз, риккетсиоз, лейшманиоз, а также возбудителя собачьего эрлихиоза и др. Имидаклоприд – неоникотиноид, механизм действия которого заключается в блокировании работы белковых рецепторов нервных клеток паразита, что ведет к невозможности проведения нервного импульса и далее – к параличу и смерти.

Фипронил – инсектоакарицид группы фенилпиразолов, механизм его действия заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов эктопаразитов, нарушении передачи нервного импульса, что приводит к параличу и гибели насекомых и клещей.

При совместном применении имидаклоприд усиливает инсектоакарицидное действие фипронила.

При нанесении лекарственного препарата на кожу имидаклоприд и фипронил практически не всасываются в системный кровоток, накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах и оказывают длительное контактное инсектоакарицидное действие.

Однократная обработка животного лекарственным препаратом Бинакар Форте обеспечивает уничтожение блох и клещей в течение 24 часов. Гибель насекомых наступает в течение 12-24 часов после обработки животного.

Защитное действие лекарственного препарата против клещей продолжается до 4 недель, против насекомых – 4-5 недель.

Бинакар Форте по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), при нанесении на кожу в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

#### Показания к применению

Бинакар Форте применяют собакам и кошкам для лечения и профилактики акарозов, вызываемых иксодовыми клещами, энтомозов, вызываемых блохами, вшами и власоедами; аллергического дерматита, связанного с укусами насекомых и клещей, а также с целью предотвращения нападения эктопаразитов на животных.

#### Порядок применения

Бинакар Форте применяют однократно путем нанесения на сухую неповрежденную кожу животного в места, недоступные для слизывания. Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Перед применением отрезают кончик тюбик-пипетки, раздвигают шерсть и капельно наносят лекарственный препарат в области шеи у основания черепа или между лопатками, в 3-4 точках.

Дозы применения лекарственного препарата зависят от вида и массы животного.

масса животного	количество тюбик-пипеток
<b>Для собак и щенков мелких пород (тюбик-пипетки по 0,5 мл)</b>	
2-5 кг	1
5-10 кг	2
10-20* кг	4
*При обработке собак массой более 20 кг препарат применяют из расчета 1 мл на каждые последующие 10 кг массы животного.	
<b>Для собак и щенков средних пород (тюбик-пипетки по 1 мл)</b>	
2-5 кг	1/2
5-10 кг	1
10-20 кг	2
20-30 кг	3
30-40* кг	4
*При обработке собак массой более 40 кг препарат применяют из расчета 1 мл на каждые последующие 10 кг массы животного.	

масса животного	количество тьюбик-пипеток
<b>Для собак и щенков крупных пород (тьюбик-пипетки по 2 мл)</b>	
10-20 кг	1
20-30 кг	1+1/2
30-40* кг	2
*При обработке собак массой более 40 кг препарат применяют из расчета 1 мл на каждые последующие 10 кг массы животного.	
<b>Для кошек и котят (тьюбик-пипетки по 0,4 мл)</b>	
1-2 кг	1/2
3-4 кг	1
4-8 кг	2

Минимальная терапевтическая доза – 0,1 мл на 1 кг массы животного.

Во время обработки необходимо избегать попадания лекарственного препарата на слизистые оболочки животного. Не следует мыть или купать животное в течение 24 часов после обработки.

Для уничтожения иксодовых клещей, блох, вшей и власоедов обработку животного проводят однократно, для предотвращения повторной инвазии или для защиты от нападения насекомых – 1 раз в месяц на протяжении всего сезона активности паразитов.

При лечении и профилактике аллергического дерматита, связанного с укусами насекомых и клещей, лекарственный препарат целесообразно использовать в сочетании со средствами патогенетической и симптоматической терапии.

Лекарственный препарат сохраняет свою эффективность после намочения шерсти, однако не следует допускать длительного нахождения животного в воде после обработки. Если этого избежать невозможно, проводят дополнительную обработку животного препаратом Бинакар Форте под контролем ветеринарного врача. Дополнительные обработки лекарственным препаратом допускается проводить не чаще 1 раза в неделю.

Если возникает необходимость помыть животное с шампунем, рекомендуется сделать это до обработки препаратом Бинакар Форте.

Для предотвращения повторной инвазии подстилки животных заменяют или обрабатывают инсектоакарицидными препаратами в соответствии с инструкциями по их применению.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее следует провести как можно быстрее в той же дозе и по той же схеме.

#### **Побочные явления и осложнения**

Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций (покраснение, зуд) лекарственный препарат следует смыть водой с моющим средством, промыть кожу и шерсть большим количеством проточной воды и при необходимости назначить животному антигистаминные и симптоматические препараты.

#### **Противопоказания**

Противопоказанием к применению лекарственного препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к его компонентам (в том числе в анамнезе). Запрещается применение лекарственного препарата больным инфекционными заболеваниями, ослабленным и выздоравливающим животным. Не следует применять Бинакар Форте щенкам моложе 8-недельного возраста и/или массой менее 1 кг, котят моложе 8-недельного возраста и/или массой менее 0,5 кг, а также животным других видов. Запрещается применять лекарственный препарат беременным и лактирующим самкам.

#### **Передозировка**

При передозировке лекарственного препарата у животных может наблюдаться угнетенное состояние, повышенное слюноотделение, тремор, рвота. В этом случае лекарственный препарат рекомендуется смыть водой с моющим средством и принять общие меры, направленные на его выведение из организма.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Лекарственный препарат Бинакар Форте не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными лекарственными препаратами.

#### **Особые указания**

Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

#### **Меры личной профилактики**

При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. Обработку животных следует проводить в резиновых перчатках. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. В течение 24 часов после обработки животных не следует гладить и подпускать к маленьким детям. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с ним. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, ее помещают в целлофановый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

#### **Условия хранения**

Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 до 25°C. Лекарственный препарат следует хранить в недоступном для детей месте. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

Лекарственный препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

СТО 18678116-111-2021



Производитель: АО «Агробипром», РФ.  
 Адрес производства: 143985, Россия, Московская обл., г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.  
 тел./факс: +7 (495) 607-50-34, +7 (495) 607-67-81  
[www.agrobioprom.ru](http://www.agrobioprom.ru)



**Agrobioprom**  
 ветеринарные препараты