

«Диронет спот-он»

«Диронет спот-он» назначают взрослым собакам и кошкам, щенкам и котят старше 2-месячного возраста с целью лечения и профилактики кишечных нематодозов, цестодозов, энтомозов, отодектоза, саркоптоза, нотоэдроза и демодекоза.

Дозировка и способ применения

Препарат применяют животным путем капельного («spot-on») нанесения на сухую неповрежденную кожу. Перед использованием у тубик-пипетки отламывают кончик и, раздвинув шерсть, наносят препарат животному на кожу вдоль позвоночника, в недоступные для слизывания места, в области шеи у основания черепа или между лопатками. При обработке крупных животных содержимое пипеток наносят на кожу в 3-4 места. В зависимости от массы животного используют препарат «Диронет спот-он» различной фасовки в дозах, указанных в таблице. Минимальная терапевтическая доза препарата для взрослых животных составляет 0,2 мл/кг массы животного, что соответствует для собак – 17 мг/кг празиквантела и 4 мг/кг ивермектина; для кошек – 17 мг/кг празиквантела и 1 мг/кг ивермектина. Минимальная терапевтическая доза препарата для щенков и котят составляет 0,1 мл/кг массы, что соответствует для щенков – 8,5 мг/кг празиквантела и 2 мг/кг ивермектина, для котят – 8,5 мг/кг празиквантела и 0,5 мг/кг ивермектина. С учетом вида, возраста и массы обрабатываемого животного выбирают тубик-пипетки необходимого объема или их комбинации

Масса животного	Доза препарата, количество пипеток
Щенки с 2-месячного возраста:	
до 1 кг	1
от 1 кг до 2 кг	2
Взрослые собаки:	
от 2 кг до 5 кг	1
от 5 кг до 10 кг	2
от 10 кг до 20 кг	3
от 20 кг до 30 кг	4
более 30 кг	5
Котята с 2-месячного возраста:	
до 1 кг	1
Взрослые кошки:	

от 2 кг до 5 кг	1
более 5 кг	2

Для уничтожения блох, вшей и власоедов обработку животного проводят однократно, для предотвращения повторной инвазии – один раз в месяц на протяжении всего сезона активности насекомых. В целях предотвращения повторной инвазии блохами животным заменяют подстилки или обрабатывают их инсектицидным спреем «Барс», «Барс форте». Для длительной защиты животного от блох и других эктопаразитов применяют инсектоакарицидные капли «Барс», «Барс форте» или инсектоакарицидный ошейник «Барс». Для лечения отодектоза (ушной чесотки) препарат наносят на кожу однократно. При необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц. В процессе лечения рекомендуется очищать слуховой проход от экссудата и струпьев, а в случае осложнения отитом - назначать противомикробные и противовоспалительные средства. С лечебной целью при саркоптозе и демодекозе собак и нотоэдрозе кошек препарат применяют 2–4 кратно с интервалом 10–14 дней до получения двукратных отрицательных результатов акарологического исследования; в целях профилактики возможной инвазии – 1 раз месяц. Лечение рекомендуется проводить комплексно с применением этиотропных, патогенетических и симптоматических лекарственных средств в соответствии с инструкциями по их применению. Для дегельминтизации животных при нематодозах и цестодозах желудочно-кишечного тракта препарат применяют с лечебной целью однократно, с профилактической - один раз в квартал.

Побочное действие

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и осложнений не наблюдается. В редких случаях при повышенной индивидуальной чувствительности к препарату возможно слезотечение, избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота или признаки раздражения кожи на месте нанесения препарата. В эти случаях применение препарата прекращают и смывают его водой с мылом или зоошампунем.

Особые указания

Не следует наносить на влажную или поврежденную кожу, мыть животное в течение 4 суток после обработки препаратом, а также применять одновременно с другими противопаразитарными лекарственными средствами.

Противопоказания

«Диронет спот-он» запрещается применять щенкам и котятм моложе 2-месячного возраста, а также беременным, кормящим, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным.

Форма выпуска

Полимерные тубик-пипетки для собак, кошек, щенков и котят. Внешняя упаковка – картонная коробка.