

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата
для ветеринарного применения
ЭНТЕРОЗОО®, суспензия

Регистрационный номер: РК-ВП-4-3077-15.

Торговое название препарата: ЭНТЕРОЗОО®

Международное непатентованное или группировочное название:

Полиметилсилоксана полигидрат.

Химическое название:

Продукт нелинейной поликонденсации 1,1,3,3- тетрагидрокси-1,3- диметилдисилоксана полигидрат.

Лекарственная форма: Суспензия для приема внутрь.

Состав на 100 г препарата: Полиметилсилоксана полигидрат – 60 г, очищенная вода – 40 г.

Описание: Неоднородная пастообразная масса от белого до почти белого цвета без запаха, возможно расслоение.

Фармакотерапевтическая группа: Энтеросорбирующее средство.

Фармакологические свойства: ЭНТЕРОЗОО® - полимерное гелевидное кремнийорганическое соединение, имеет пористую структуру. ЭНТЕРОЗОО® обладает выраженными сорбционными и детоксикационными свойствами. В просвете желудочно-кишечного тракта препарат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая бактерии и бактериальные токсины, микотоксины, антигены, пищевые аллергены и яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды. Препарат сорбирует некоторые продукты обмена веществ организма, в том числе избыток билирубина, мочевины, холестерина, липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза. ЭНТЕРОЗОО® не уменьшает всасывание витаминов и микроэлементов, способствует восстановлению нарушенной микрофлоры кишечника и не влияет на его моторику.

Фармакокинетика: Препарат не всасывается в желудочно-кишечном тракте, выводится в неизменном виде.

Показания к применению:

Острые отравления, включая кормовые отравления с симптомами острой диареи.

Тяжелые отравления и интоксикации с симптомами длительной диареи, вызванные солями тяжелых металлов, пестицидами и др.

Кормовые токсикоинфекции, включая поражения микотоксинами.

Кишечные инфекции различной этиологии: бактериальной, вирусной (включая ротавирусы), грибковые, вызванные простейшими с симптомами острой и хронической диареи.

Заболевания желудочно - кишечного тракта (энтериты, колиты, панкреатиты, холециститы и др.).

Повреждения кишечной микрофлоры (включая нарушения пищеварения, связанные с приемом антибиотиков).

Хронические заболевания печени и почек, сопровождающиеся недостаточностью.

Аллергические заболевания.

Кожные заболевания.

ЭНТЕРОЗОО® можно применять также и здоровым животным в профилактических целях.

ЭНТЕРОЗОО® позволяет повысить сопротивляемость организма к болезням и улучшить общее состояние организма животного.

Противопоказания: Противопоказания к применению ЭНТЕРОЗОО® не выявлены.

Меры предосторожности при применении: Работа с ЭНТЕРОЗОО® требует соблюдения общих правил личной гигиены, предусмотренных для работы с лекарственными средствами.

Применение у беременных и кормящих животных: ЭНТЕРОЗОО® может применяться при беременности и у кормящих животных.

Способ применения и дозы:

ЭНТЕРОЗОО® рекомендуется применять при первых признаках заболевания или отравления у животного. Препарат не имеет запаха и вкуса, поэтому животные принимают его хорошо. Вводится различными способами: непосредственно орально, вместе с кормом, в смеси с водой в ротовую полость или через питательный насос, зонд, шприц и т.д.

Стандартная доза

Доза для каждого конкретного вида животного устанавливается в зависимости от его вида, пола, возраста и физиологического состояния. Для удобства измерения дозировки указываются в столовых и чайных ложках.

Приблизительный эквивалент

1 чайная ложка равна 5 г; 1 столовая ложка равна 15 г.

Собаки и щенки: до 4 кг – 1 чайная ложка 2 раза в день; до 15 кг – 2 чайные ложки 2 раза в день; 15-50 кг – 3 чайные ложки 2 раза в день; более 50 кг – 1 столовая и 1 чайная ложки 2 раза в день, ввести непосредственно в ротовую полость, смешать с кормом или намазать на лакомство, смешать с небольшим количеством воды и ввести в ротовую полость с помощью пластикового шприца.

Кошки и котят: до 2 кг – 1 чайная ложка 2 раза в день; более 2 кг – 2 чайные ложки 2 раза в день, ввести непосредственно в ротовую полость, смешать с кормом или намазать на лакомство, смешать с небольшим количеством воды и ввести в ротовую полость с помощью пластикового шприца.

Кролики, морские свинки, хорьки, нутрии: 1 чайная ложка 2 раза в день, смешать в поилке с водой или ввести в ротовую полость с помощью пластикового шприца, предварительно смешав с небольшим количеством воды.

Хомяки, мыши, крысы: ½ чайной ложки 2 раза в день, смешать в поилке с водой или ввести в ротовую полость с помощью пластикового шприца, предварительно смешав с небольшим количеством воды.

Экзотические птицы: 1 чайная ложка 2 раза в день, смешать в поилке с водой или ввести непосредственно в ротовую полость, смешав с небольшим количеством воды.

Острые отравления с симптомами острой диареи
Первая дозировка – 2 стандартные дозы, затем 1 стандартная доза после каждого опорожнения кишечника. После купирования диареи рекомендуется применять ЭНТЕРОЗОО® в течение 5 последующих дней в соответствии со стандартной дозой по виду и весу животного.

Тяжелые отравления и интоксикации с симптомами длительной диареи
Первая дозировка – 2 стандартных дозы, затем 1 стандартная доза каждый час в течение 24 часов до полного исчезновения признаков отравления. Применение препарата ЭНТЕРОЗОО® не исключает возможности применения его с основными лекарственными средствами, в зависимости от тяжести и специфики (этиологии) отравления. Продолжительность лечения препаратом ЭНТЕРОЗОО® может достигать 10 – 14 дней.

Профилактическая детоксикация
1 стандартная доза 2 раза в день в течение 10-14 дней.

Рекомендации по продолжительности лечения: В случае острого отравления рекомендуется давать ЭНТЕРОЗОО® в течение 3-5 дней.

В случае острого отравления (включая кормовое отравление), сопровождающегося аллергическими реакциями, заболеваниями ЖКТ, кишечных инфекций различной этиологии, хронических заболеваний печени и почек, аллергических и кожных заболеваний рекомендуется продолжительность лечения ЭНТЕРОЗОО® составляет 2-3 недели, по схеме лечения, назначенной ветеринарным врачом.

Побочные реакции: Не наблюдались.

Передозировка: Случаев передозировки не отмечалось. Животные, в том числе и молодняк, хорошо переносят ЭНТЕРОЗОО® даже в больших дозах.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: Препарат может использоваться с другими лекарственными средствами, при этом уменьшения всасывания лекарственных средств не наблюдалось.

Дополнительные сведения: ЭНТЕРОЗОО® не содержит сахара, подсластителей, лактозы, глютена, жиров, красителей, ароматизаторов и консервантов.

Форма выпуска: Суспензия для приема внутрь в тубах из комбинированных материалов по 100 г или в пакетах из материала комбинированного многослойного на основе алюминиевой фольги и пленки по 15 г. Каждую тубу или по 10 или по 15 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности: 3 года. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения: Хранить при температуре не ниже 4 °С и не выше 30 °С. Предохранять от высыхания после вскрытия упаковки. Беречь от замораживания.

Хранить в местах, недоступных для детей.
Продукцию от сельскохозяйственных животных и птиц, которые получали ЭНТЕРОЗОО®, можно использовать в пищу без ограничений.

Условия отпуска: Отпускают без рецепта ветеринарного врача.

Производитель:
ООО «ТНК СИЛМА»
399851, Россия, Липецкая обл., г. Данков, ул. Л. Толстого, д. 32/2
Тел. факс (495) 223-91-00, www.enterozoo.ru
E-mail: info@enterosgel.ru

Заявитель:
ООО «ЭСФАРМ»
115573, Россия, г. Москва, ул. Шипиловская, д.50, корп.1, стр.2
тел. факс (495) 223-91-00, www.enterozoo.ru
E-mail: info@enterosgel.ru