**Инструкция по применению препарата Инспектор Мини**
**при арахноэнтомозах и нематодозах котят, щенков, кошек и собак мелких пород**
(Организация-разработчик: Veterinary Bio UG, Wilhelm-Leuschner Str. 41, 60329, Frankfurt am Main, Germany)

## I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Инспектор Мини (Inspector Mini).
Международное непатентованное наименование: моксидектин.

Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Инспектор Мини в качестве действующего вещества содержит моксидектин - 5,2 мг/мл, а в качестве вспомогательных веществ: диэтиленгликоля моноэтиловый эфир (ДЭМЭ), полиэтиленгликоль (ПЭГ-400), бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол.

По внешнему виду представляет собой прозрачную маслянистую бесцветную или светло-жёлтого цвета жидкость.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства. Инспектор Мини по истечении срока годности не должен применяться.

Инспектор Мини выпускают расфасованным по 0,4 мл в полимерные пипетки, которые поштучно упаковывают в полимерные блистеры вместе с инструкцией по применению и помещают в картонные пачки.

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°С до 30°С в недоступном для детей месте.
Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

Инспектор Мини относится к группе противопаразитарных препаратов.

Входящий в состав препарата моксидектин обеспечивает его широкий спектр противопаразитарного действия в отношении блох (Ctenocephalides felis, Ctenocephalide canis), вшей (Trichodectes canis), власоедов (Felicola subrostratus), чесоточных (Sarcoptes scabiei var. canis, Sarcoptes scabiei var. cati, Notoedres cati, Otodectes cynotis, Demodex canis), иксодовых клещей, личиночных и половозрелых фаз развития нематод, включая Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Angyostrongylus vasorum, Crenosoma vulpis, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, личиночные фазы развития (микрофилярий) Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens.

Моксидектин - полусинтетическое соединение группы милбемицинов (макроциклические лактоны) обладает выраженным системным и контактным действием в отношении личинок и имаго эктопаразитов и нематод, оказывает стимулирующее действие на выделение гамма-аминомасляной кислоты, повышает проницаемость мембран для ионов хлора, что подавляет активность нервных клеток паразитов, вызывая нарушение мышечной иннервации, паралич и гибель эктопаразитов и нематод. Моксидектин при накожном применении хорошо всасывается, поступает в системный кровоток, органы и

ткани, из организма выводится в течение 28-30 суток, в основном в неизмененном виде с фекалиями.
После однократной обработки защитное действие препарата от эктопаразитов и нематод продолжается до 30 суток.

Инспектор Мини по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, резорбтивно-токсического и сенсибилизирующего действия. Препарат токсичен для пчел, рыб и других гидробионтов.

**III. Порядок применения**
Инспектор Мини назначают котятам, щенкам, а также собакам и кошкам мелких пород для лечения и профилактики энтомозов (блохи, вши, власоеды), акарозов (иксодидозы, отодектоз, нотоэдроз, саркоптоз, демодекоз) и нематодозов желудочно-кишечного тракта (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалез), а также в целях профилактики дирофиляриоза.

Противопоказанием к применению Инспектор Мини является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями и ослабленные животные.

Не допускается аурикулярное применение препарата (при ушной чесотке) при прободении барабанной перепонки.

Обработку щенков породы колли, бобтейл, шелти и других пород собак, чувствительных к макроциклическим лактонам, проводят под наблюдением ветеринарного врача.

Инспектор Мини при энтомозах, иксодидозах и нематодозах применяют животным путем капельного («spot-on») нанесения на сухую неповрежденную кожу в места, недоступные для слизывания - между лопатками у основания шеи. У пипетки отламывают или отрезают верхнюю часть и наносят в дозах, указанных в таблице:

| Вид животного | Масса животного, кг | Доза препарата, мл | Кол-во ДВ, мг/кг |
|---|---|---|---|
| Собаки, щенки | 0,5 - 2,0 | 0,4 | 1-4 |
| Кошки, котята | 0,5 - 2,0 | 0,4 | 1-4 |

При обработке животных массой более 2 кг, препарат применяется в дозе 0,2 мл на 1 кг массы тела.

Для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей обработку животных проводят однократно, для предотвращения повторной инвазии - один раз в месяц на протяжении всего сезона активности эктопаразитов.

В целях предотвращения повторной инвазии блохами животным заменяют подстилки или обрабатывают их разрешенным к использованию инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по применению.

Для уничтожения присосавшихся иксодовых клещей на теле животного препарат в количестве 1 капли наносят на клеща и место его прикрепления к коже. Если в течение 20

минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают из кожи пинцетом и уничтожают.

Для лечения отодектоза наружный слуховой проход очищают от струпьев и корок, затем закапывают в каждое ухо по 3 капли препарата (капли обязательно вводят в оба уха), ушную раковину складывают вдоль пополам и массируют ее основание. Остаток препарата в используемой пипетке (в расчете на массу животного) наносят на кожу между лопаток. Обработку проводят 2 раза с интервалом 7 дней.
При отодектозе, осложненном отитом, назначают противомикробные и противовоспалительные средства. При необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц под контролем микроскопии соскобов с внутренней поверхности ушной раковины.
В случае прободения барабанной перепонки препарат применяют путем капельного нанесения на кожу между лопатками у основания шеи в дозе, указанной в таблице.

При саркоптозе, нотоэдрозе и демодекозе обработку проводят 2-4-кратно с интервалом 7 дней до клинического выздоровления животного. Лечение рекомендуется проводить комплексно с применением патогенетических и симптоматических лекарственных средств до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами микроскопических исследований соскобов.

Для дегельминтизации животных препарат применяют путем капельного нанесения на кожу с лечебной целью однократно, с профилактической целью - один раз в месяц в дозах, указанных в таблице.

С целью профилактики дирофиляриоза в неблагополучных по заболеванию регионах препарат применяют в весенне-летне-осенний период, перед началом лёта комаров (переносчиков возбудителей D. immitis, D. repens) однократно, затем один раз в месяц и последний раз в сезоне через 1 месяц после завершения лёта насекомых.
Инспектор Мини не уничтожает половозрелых дирофилярий, но снижает количество циркулирующих в крови микрофилярий и может быть применен без опасений также и инвазированным животным.

Препарат не следует наносить на влажную или поврежденную кожу, мыть животное в течение 4 суток после обработки препаратом.
При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетение, избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат тщательно смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.
Особенностей действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не выявлено.

Не подлежат обработке котята и щенки моложе 3-недельного возраста. Обработку самок в период беременности и вскармливания при необходимости следует проводить с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача.

В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозе по той же схеме.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата Инспектор Мини в соответствии с настоящей инструкцией,как правило, не наблюдается. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата животного, препарат следует тщательно смыть водой с мылом и ополоснуть шерсть большим

количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.

Не следует применять Инспектор Мини одновременно с другими противопаразитарными препаратами, в связи с возможным взаимным усилением токсичности.

Инспектор Мини не предназначен для применения продуктивным животным.

**IV. Меры личной профилактики**

При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.
Во время работы с Инспектор Мини запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов после обработки. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственных площадок производителя лекарственного препарата: ЗАО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, 11.