ОТИДЕЗ

Ушные капли Отидез, предназначенные для лечения отитов, поверхностных дерматитов наружного уха и слухового прохода бактериальной, грибковой и паразитарной этиологии у животных (собак, кошек и пушных зверей). Действующие вещества препарата оказывают выраженное антибактериальное, противогрибковое, акарицидное, противовоспалительное, противоаллергическое, ранозаживляющее и обезболивающее действие.

Гентамицина сульфат является антибиотиком группы аминогликозидов, обладающий широким спектром действия в отношении разных видов грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.
Тербинафина гидрохлорид относится к группе аллиламинов, обладает широким спектром противогрибкового действия.
Перметрин оказывает акарицидное действие против саркоптойдных клещей; особенно эффективен в отношении возбудителя отодектоза — Otodectes cynotis.
Дексаметазон является синтетическим глюкокортикостероидом, оказывает выраженное противовоспалительное, противоаллергическое и десенсибилизирующее действие, что важно при лечении аллергических отитов у животных.
Бензокаин является местным анестетиком для поверхностной анестезии, оказывает быстрое обезболивающее действие.
Экстракт прополиса оказывает выраженное бактерицидное, бактериостатическое (подавляет активность и уничтожает широкий спектр микроорганизмов), противовирусное, противогрибковое, ранозаживляющее и успокаивающее действие на кожу животного.

ПОКАЗАНИЯ:

Отидез применяют для лечения острых и хронических отитов бактериальной, грибковой и паразитарной этиологии, а также для лечения острых и хронических поверхностных дерматитов наружного уха и слухового прохода; снятия проявлений аллергических реакций на коже в области уха и прилегающих к нему поверхностей у животных.

СОСТАВ:

гентамицина сульфат (0,4%), перметрин (0,03%), тербинафина гидрохлорид (1%), дексаметазон (0,1%), экстракт прополиса (0,1%), бензокаин (1%) и

вспомогательные компоненты.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:
перед применением флакон Отидеза необходимо тщательно встряхнуть и провести гигиеническую обработку ушной раковины и наружного слухового прохода тампоном, смоченным небольшим количеством препарата, затем закапать в каждое ухо: кошкам, пушным зверям и собакам мелких пород — 3 капли, собакам средних пород-4 капли, собакам крупных пород — 5 капель два раза в сутки, помассировать у основания уха. Курс лечения составляет 5-10 дней, далее по назначению ветеринарного врача. При необходимости курс лечения после недельного перерыва повторяют. При лечении ушного клеща (отодектоза) Отидез закапывают по 3-4 капли в слуховой проход, предварительно очищенный от корок и струпьев, двукратно с 5-7-дневным интервалом. При необходимости повторные обработки проводят через 14 дней. Отидез обязательно вводят в оба уха.
При лечении поверхностных дерматитов наружного и внутреннего уха у животных Отидез следует наносить 2-3 раза в день на пораженную область, до клинического выздоровления.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не применять Отидез при перфорации барабанной перепонки и гиперчувствительности к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
срок годности при соблюдении условий хранения — 2 года со дня изготовления. Срок хранения после вскрытия упаковки — 25 дней.