

Селафорт

противопаразитарный лекарственный препарат для собак и кошек

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Торговое наименование лекарственного препарата: Селафорт (Selafort).

Международное непатентованное наименование: селамектин.

Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Селафорт в форме 12% раствора в качестве действующего вещества содержит селамектин 120 мг/мл и вспомогательные вещества: изопропиловый спирт, бутилгидрокситолуол, диметилсульфоксид.

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор от бесцветного до желтого цвета, или от бесцветного до коричневого, или от бесцветного до коричнево-желтого, или от бесцветного до желто-зеленого цвета.

Селафорт выпускают расфасованным в полимерные пипетки по 0,25 мл (фиолетовый колпачок). Пипетки упаковывают по 1 штуке в блистер, который помещают вместе с инструкцией по применению в картонные коробки. Цвет коробки и колпачка пипетки в этой коробке одинаковы.

Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Селафорт относится к противопаразитарным лекарственным препаратам группы макроциклических лактонов.

Действующее вещество препарата - селамектин обладает широким спектром системного нематоцидного, инсектицидного и акарицидного действия, активен против нематод, насекомых и саркоптоидных клещей, паразитирующих у собак и кошек, обладая ларвицидными и овоцидными свойствами, прерывает цикл развития насекомых. Фармакокинетические свойства препарата обеспечивают хорошее всасывание селамектина с места нанесения, длительное поддержание терапевтических концентраций в органах и тканях животного, что обеспечивает уничтожение паразитов и

защиту животных от реинвазии в течение месяца. Механизм действия селамектина заключается в его способности связываться с рецепторами клеток (мышечной и нервной ткани) паразитов, повышать проницаемость мембран для ионов хлора, что вызывает блокаду проводимости нервных и мышечных клеток у нематод, насекомых, клещей и приводит к параличу и гибели паразитов. Учитывая, что у млекопитающих рецепторы, чувствительные к селамектину, локализованы только в центральной нервной системе, а селамектин не проникает через гематоэнцефалический барьер, отравление собак и кошек маловероятно.

Селафорт по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающим, резорбтивно-токсическим и сенсibiliзирующим действием, хорошо переносится кошками и собаками разных пород, включая колли и родственные породы собак. Препарат токсичен для пчел, а также для рыб и других гидробионтов.

ПОКАЗАНИЯ

Селафорт назначают собакам с лечебной и профилактической целью при энтомозах, вызванных блохами, вшами и власоедами, отодектозе, саркоптозе, анкилостомозе и токсокарозе, а также для профилактики диروفиларииоза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе и в анамнезе). Селафорт не следует наносить на влажную и/или поврежденную кожу.

Беременным и лактирующим самкам при необходимости Селафорт применяют после консультации с ветеринарным врачом. Селафорт не следует применять щенкам и котятм моложе 6-недельного возраста.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Селафорт применяют собакам путем однократного нанесения на сухую неповрежденную кожу, используя пипетки различной фасовки. Перед применением препарата пипетку вынимают из блистера и, держа вертикально, нажимают на колпачок с тем, чтобы проткнуть носик пипетки, затем колпачок снимают и, раздвинув шерсть между лопатками у основания шеи, выдавливают содержимое пипетки, непосредственно на кожу

животного. Дозу препарата (объем пипетки) выбирают, учитывая вид и массу животного:

| Собаки (кг) | Цвет колпачка пипетки | Селамектин (мг) | Концентрация (мг/мл) | Объем пипетки (мл) |
|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| ≤2,5 | розовый | 15 | 60 | 0,25 |
| 2,6-5,0 | фиолетовый | 30 | 120 | 0,25 |
| 5,1-10,0 | оранжевый | 60 | 120 | 0,5 |
| 10,1-20,0 | красный | 120 | 120 | 1,0 |
| 20,1-40,0 | зеленый | 240 | 120 | 2,0 |
| 40,1-60,0 | темно-синий | 360 | 120 | 3,0 |
| >60 | - | комбинация пипеток | | |

подходящего объема** - комбинация пипеток

подходящего объема**

** например, для собак массой от 60,1 до 70 кг применяют одновременно 2 пипетки с 12 % раствором: одну с фиолетовым (0,25 мл) и одну с темно-синим (3,0 мл) колпачками.

Для уничтожения блох (*Ctenocephalides* spp.) Селафорт применяют собакам и кошкам однократно, для предупреждения повторной инвазии - один раз в месяц на протяжении всего сезона наибольшей активности насекомых.

Для профилактики дирофиляриоза в регионах, где регистрируют *Dirofilaria immitis*, Селафорт применяют животным ежемесячно, начиная за месяц до начала лета переносчиков возбудителя - комаров и москитов, и заканчивают не ранее, чем через месяц после завершения их лета. Селафорт не уничтожает половозрелых *D.immitis*, но снижает количество циркулирующих микрофилярий и личинок дирофилярий, и может применяться даже инвазированным животным.

При замене химиотерапевтических средств в программе профилактики дирофиляриоза, интервал между применением Селафорта и ранее используемым лекарственным средством должен составить не менее одного месяца.

Для лечения собак и кошек при отодектозе (ушной чесотке), вызванном *O. cynotis*, Селафорт применяют однократно. В период лечения рекомендуется проводить очистку слухового прохода от экссудата и струпьев, а в случаях осложнения отодектоза бактериальным отитом, назначать противомикробные и противовоспалительные средства.

При необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц.

Для лечения собак при саркоптозе, вызванном *S. canis*, Селафорт применяют двукратно с интервалом 1 месяц, в целях профилактики возможной инвазии препарат рекомендуется: применять 1 раз в месяц.

Для дегельминтизации собак и кошек при токсокарозе, вызванном *Toxocara cati*, *Toxocara canis*, анкилостомозе, вызванном *Ancylostoma tubaeformae*, препарат применяют с лечебной целью однократно, с целью профилактики - ежемесячно.

Время необходимое для полного всасывания Селафорта составляет около тридцати минут. По истечении двух часов, в случае необходимости, животное можно мыть даже с применением шампуня, эффективность лекарственного препарата при этом не снижается.

Особенностей действия при первом применении и отмене препарата не выявлено.

При обработке животных следует придерживаться рекомендуемых инструкцией интервалов. В случае пропуска очередной обработки, применение препарата следует возобновить как можно скорее, в той же дозе по той же схеме.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

При передозировке препарата у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством, животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Селафорт не предназначен для применения продуктивным животным.

Селафорт не следует применять одновременно с другими противопаразитарными препаратами группы макроциклических лактонов, в связи с возможным взаимным усилением их токсичности.

Меры личной профилактики

При работе с Селафортом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

Не следует подпускать животное к маленьким детям, а также гладить место обработки в течение 2 часов после нанесения препарата.

При случайном попадании лекарственного препарата на кожу и слизистые оболочки его следует тотчас удалить тампоном и затем смыть большим количеством проточной воды.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Селафортом. В случае проявления аллергической реакции или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0°C до 25°C. Хранить пипетки в оригинальной упаковке до использования.

Селафорт следует хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства. Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Форма выпуска Раствор для наружного применения. Пипетка 0, 25 мл

Для кого предназначено Для собак массой от 2, 6 кг до 5 кг

Показания к применению Назначают собакам с лечебной и профилактической целью при энтомозах, вызванных блохами, вшами и власоедами, отодектозе, саркоптозе, анкилостомозе и токсокарозе, а также для профилактики дирофиляриоза

Единица измерения Упаковка

Производитель КРКА (KRKA) [все товары] (Словения)

КРКА (KRKA)

[Подробнее о производителе](#)