СТОП-КОКЦИД®

Форма выпуска, состав и упаковка

Суспензия для приема внутрь белого цвета; при хранении допускается расслоение, исчезающее при взбалтывании.

	1 мл
толтразурил	50 мг

Вспомогательные вещества: натрия бензоат, калия сорбат, натрия карбоксиметилцеллюлоза, аспасвит Ц 200, лактоза, полисорбат 80, кремния диоксид коллоидный, пропиленгликоль, ксантановая камедь, лимонная кислота, 20% эмульсия полидиметилсилоксана, вода очищенная.

Расфасован по 10, 100, 250 мл и 1 л в полимерные флаконы с навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия. Флаконы объемом 10, 100 и 250 мл помещены поштучно в картонную пачку. Каждая потребительская упаковка снабжена инструкцией по применению.

Фармакологические (биологические) свойства и эффекты

Противококцидийный препарат группы триазинтриона.

Толтразурил, входящий в состав препарата, обладает широким спектром кокцидиоцидного действия на стадиях внутриклеточного развития паразитов, эффективен в отношении всех видов кокцидий, включая Eimeria spp., Isospora spp., Cistoisospora spp., паразитирующих у поросят, телят, ягнят и щенков собак.

Толтразурил оказывает повреждающее действие на митохондрии и процессы деления ядра кокцидий. Нарушая процесс формирования макрогаметоцитов и блокируя дыхательные ферменты, вызывает гибель паразитов.

После перорального введения препарата толтразурил медленно всасывается и оказывает кокцидиоцидное действие на слизистой и подслизистой оболочках желудочно-кишечного тракта.

В организме толтразурил метаболизируется путем сульфокисления и гидроксилирования,с образованием сульфоксида и сульфона. Выводится из организма в основном в неизменном виде (до 70%), а также в виде метаболитов с фекалиями и частично с мочой.

Стоп-кокцид по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не вызывает у животных побочных явлений и осложнений, не препятствует формированию иммунитета к кокцидиозу.

Показания к применению препарата СТОП-КОКЦИД®

— лечение и профилактика кокцидиозов у телят, ягнят, козлят, поросят и щенков собак.

Порядок применения

Стоп-кокцид применяют животным перорально индивидуально с помощью шприца-дозатора. В случае появления осадка емкость с суспензией перед использованием следует тщательно встряхнуть.

Дозы и схемы применения препарата представлены в таблице.

Вид животного	**Возраст**	**Доза лекарственного препарата на 1 кг массы животного**		**Кратность и длительность применения препарата**
		ДВ, мг/кг	**суспензии, мл/кг**	
Телята, ягнята и козлята	с 14 дней	15	0.3	однократно
Поросята	с 3 дней	20	0.4 (не менее 0.5 и не более 2 мл/животное)	однократно
Щенки собак	с 14 дней	10	0.2	1 раз в день, 3 дня подряд

В неблагополучных по кокцидиозу хозяйствах для достижения максимального профилактического эффекта и снижения количества ооцист, выделяемых во внешнюю среду, препарат следует назначать восприимчивым животным до появления в стаде первых клинических признаков заболевания.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

Несоблюдение рекомендуемого интервала при повторном введении препарата щенкам собак может привести к снижению его эффективности. При пропуске очередной дозы препарата его следует ввести как можно скорее.

Побочные эффекты

При применении препарата в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности к препарату и появлении аллергических реакций животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

При *передозировке* препарата у животного может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды, расстройство ЖКТ.

Противопоказания к применению препарата СТОП-КОКЦИД®

— повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата;

— серьезные нарушения функции печени и/или почек.

Запрещается применение препарата:

— дойным животным (ввиду его выделения с молоком);

— взрослым жвачным с развитым рубцовым пищеварением.

Особые указания и меры личной профилактики

Стоп-кокцид не следует применять одновременно с другими противококцидийными препаратами. Сведения о несовместимости препарата с лекарственными средствами других групп и кормовыми добавками отсутствуют.

Убой телят, ягнят и козлят на мясо разрешается не ранее чем через 70 суток, поросят - не ранее чем через 91 сутки после применения Стоп-кокцида. Мясо животных, вынужденно убитых ранее установленных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям.

Меры личной профилактики

При работе со Стоп-кокцидом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта со Стоп-кокцидом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Условия хранения СТОП-КОКЦИД®

Препарат следует хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 0° до 25°С.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Срок годности СТОП-КОКЦИД®

Срок годности при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года со дня производства.